No. 35

Par M. Ané
Eleve en chirurgie de l'Ecole pratique

Le desir de me perfectionner, m'a fait faire des reflections, concernant les differentes methodes de faire l'operation de la hernie jnguinale simple, pour en obtenir la cure radicale, et prevenir la recidive de celles qui ont été operées; entre autres methodes, sont celles de mr. Francou, que Mr. Morreau conseille en les perfectionnant, et qu'un de nos professeurs approuve et en a fait une leçon il y a quelque temps à ce sujet! c'est ce qui m'a fait ressouvenir d'une methode qui me paroit, plus douce, plus sure, et moins susceptible d'accidents facheux;
voicy Monsieur ce dont il s'agit.

premierement, je ferois une jncision aux teguments avec le bistoury vis a vis l'anneau et je la continuerois en descendant de la longueur d'un pouce et demi, je ferois une pareille jncision en commencent visavis la premiere ala distance de douze a quatorze lignes, et la finissant de même que l'autre, mais de façon qu'il en resulte lambeau triangulaire, dont la base sera en haut et la

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 16 d 2 n°52

pointe En bas, je detacherois Ensuite ce lambeau par sa pointe jusqu'a sa base qui resteroit continue aux teguments, je fairois tenir ce lambeau par un aide pendant que je maneuvrerois pour decovrir l'anneau, a la circonference duquel je ferois plusieurs petites mouchetures, de même qu'a la partie du lambeau qui se trouveroit recouverte de la peau, aprésquoi j'introduirois sa pointe dans l'anneau, ce qui feroit une Espece de bouchon; et je panserois la playe par le moyen d'un appareil convenable.
Maintenant il s'agit de savoir; 1° si ce lambeau pourra Contracter adherance avec la circonference de l'anneau, n'etant En partie qu'aponevrotique, 2° si par les mouchetures qu'on y fera il ne pourra pas En resulter d'accidens facheux, comme on le voit a l'occasion des playes faites aux parties de même nature, 3° Enfin si ce lambeau ne se detruira pas par la suppuration; tout ce que je sais, c'est que je l'ay veu pratiquer par un chirurgien de toulouse il y a Environ huit ans, sur un homme agé de cinquante a soixante ans qui En Etoit affligé depuis plusieurs années, il fut queri par cette operation sans

qu'elle ait été suivie d'aucun accident facheux, n'y de recidive de ce coté là, je dis de ce coté la parce qu'il en avoit une autre du coté opposé mais moinz considerable et elle ne fut point operée; ce chirurgin ne fit point de mouchetures a la circonference de l'anneau, com je le propose ici.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE